



# 高濃度消毒用エタノール製品

(消防法危険物第4類アルコール類) エタノール (83 v/v%)



手軽ですばやい  
手指消毒

アルコール (エタノール) の濃度による殺菌 (除菌・消毒) 効果

殺菌 (除菌・消毒) に使用されるエタノール (アルコール) の殺菌効果の最適濃度範囲 (有効範囲) は下記の通りです

- 日本薬局方：76.9～81.4 v/v%
- 米国薬局方：68.5～71.5 v/v%

WHOガイドライン 60～80 v/v%

【指定医薬部外品】手指消毒用エタノール液 (76.9～81.4 vol%)



新型コロナウイルス感染防止対策に！

株式会社 落合商会  
住所 山口県下関市細江町1丁目2番7号  
TEL 083-223-4361  
FAX 083-231-9639

- ◆成分
- エタノール（83V/V%）
- グリコール類
- 変性剤
- 水



※本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指消毒に使用することが可能です。

**（令和2年4月22日付 厚生労働省の通達による。）**

[http://www.hospital.or.jp/pdf/15\\_20200422\\_02.pdf](http://www.hospital.or.jp/pdf/15_20200422_02.pdf)

アルコール専用500mlボトル

◆使用上の注意

- ・飲まないでください。
- ・用途外に使用しないでください。
- ・引火のおそれがあるので、火気の付近で使用しないでください。
- ・皮膚が弱い方はゴム手袋などの保護具を使用してください。
- ・乳幼児、子供の手の届く所には置かないでください。
- ・直射日光を避け、高温になる所には置かないでください。
- ・事前に対象物への影響（変色、変形）が無いことを確認してください。
- ・液が床や家具にかかったときは、放置すると変色することがあるのですぐに拭きとってください。

（水性ワックス・ペンキ・ニス等の塗装部、アクリル製プラスチック、白木や桐製の家具、食品には使用不可）

◆応急処置

- ・目に入った場合、清浄な水で15分以上洗い流してください。
- ・飲み込んだ場合、多量の水を飲ませてください。
- ・異常があるときは、製品を持参し医師に相談してください。

◆その他

- ・詳しくは安全データシート（SDS）を参照してください。

◆荷姿

- ・15k（石油缶）